



Zorg met vertrouwen Use Cases

Beschrijving van praktijksituaties
behorend bij rapport 'Zorg met vertrouwen'

—
1 augustus 2019



Patiëntreizen en use cases

Op basis van volume, relevantie en herkenbaarheid zijn meerdere typen zorgaanbieders geïnccludeerd in dit onderzoek. Deze zorgaanbieders zijn vervolgens opgenomen in een drietal patiëntreizen. In iedere patiëntreis vinden een aantal gegevensuitwisselingen plaats. Dit document beschrijft de patiëntreizen, de gegevensuitwisselingen en de bijbehorende autorisatieprocessen zoals gezien in de praktijk.

In overleg met de opdrachtgever zijn de volgende acht typen zorgaanbieders zijn geïnccludeerd:

- Apotheek
- GGZ instelling
- Huisarts/POH
- Huisartsenpost
- Revalidatiecentrum
- Verpleeghuis
- Wijkverpleging
- Ziekenhuis

Met deze acht zorgaanbieders als uitgangspunt zijn de mogelijke uitwisselingsbehoeften geïdentificeerd. Uit de 64 mogelijke uitwisselingsbehoeften tussen deze aanbieders is een subset vastgesteld waarin tenminste de helft van de behoeften is vertegenwoordigd.

Op basis van deze subset zijn de drie patiëntreizen gemodelleerd. De personen in de patiëntreizen zijn geïnspireerd op de persona's zoals beschreven door het Informatieberaad van VWS. De reizen worden beschreven op de navolgende pagina's.



Persona Govert

Govert is een man van middelbare leeftijd en geeft les in maatschappijleer op een middelbare school. Hij deelt niet graag zijn gegevens en is zeer privacy bewust. Hij heeft een verslavingsverleden maar is nu gezond en eet bewust.

Reis van Govert

Govert bezoekt de huisartsenpost in het weekend vanwege acute hevige pijn. Via de huisarts op de huisartsenpost wordt hij verwezen naar het ziekenhuis voor nadere diagnostiek.

In het ziekenhuis blijkt dat hij kanker heeft en gaat een oncologisch behandeltraject in. Gedurende dit traject ondergaat hij een behandeling in een hiertoe gespecialiseerd ziekenhuis. De medicijnen die hij ontvangt worden voorgeschreven door het ziekenhuis. Na deze behandeling gaat hij voor herstel en controle terug naar zijn eigen streekziekenhuis.

Govert revalideert poliklinisch na zijn oncologische behandeling bij een hierin gespecialiseerd revalidatiecentrum. De oncologische diagnose valt hem zwaar; Govert ontwikkelt depressiviteitsklachten. Hij gaat hiervoor aanvankelijk naar de huisarts, welke hem doorverwijst naar een specialist bij een GGZ instelling. Vanuit deze instelling krijgt hij medicatie voorgeschreven. Zodra hij zijn depressiviteit beter onder controle krijgt wordt hij terugverwezen naar de huisarts, vanwaar hij vanuit de POH blijvende ondersteuning krijgt.

De apotheek van Govert wil een compleet medicijn overzicht en heeft daarvoor input nodig van de ziekenhuisapotheek en apotheek van de GGZ instelling.

# Use case	Brondossierhouder	Uitwisseling naar	Autorisatiedoel
1	Huisarts	Huisartsenpost	Intercollegiale consultatie
2	Huisartsenpost	Huisarts	Intercollegiale update
3	Huisartsenpost	Ziekenhuis	Verwijzing
4	Ziekenhuis	Ziekenhuis	Verwijzing
5	Ziekenhuis	Apotheek	Medicatie voorschrijven
6	Ziekenhuis	Huisarts	Ontslag
7	Ziekenhuis	Ziekenhuis	Ontslag
8	Ziekenhuis	Revalidatiecentrum	Verwijzing
9	Huisarts/POH	GGZ poliklinisch	Verwijzing
10	GGZ	Apotheek	Medicatie voorschrijven
11	GGZ	Huisarts/POH	Ontslag
12	Apotheek	Apotheek	Intercollegiale update

Theo



Persona Theo

Theo is gepensioneerd en houdt van vissen. Theo was getrouwd met Greet, maar Greet is een jaar geleden overleden. Hij is dol op het contact met zijn kinderen en kleinkinderen.

Reis van Theo

Theo wordt overvallen door een hersenbloeding. Na de eerste opvang in het ziekenhuis, wordt hij tijdelijk opgenomen in een revalidatiecentrum. Tijdens zijn revalidatietraject wordt er medicatie voorgeschreven en er wordt overleg gepleegd met de behandelend arts uit het ziekenhuis. Later komt Theo toch in tijdelijk in een verpleeghuis terecht.

Na zijn revalidatie en tijdelijk verblijf in een verpleeghuis, gaat Theo weer thuis wonen. Hij wordt hierbij ondersteund door een wijkverpleegkundige. Zijn huisarts of het verpleeghuis schakelt de wijkverpleegkundige in. De wijkverpleegkundige, huisarts, zijn familie en hijzelf merken na verloop van tijd op dat thuis wonen niet meer gaat. Theo verhuist naar een verpleeg- en verzorgingshuis waar hij de rest van zijn leven zal wonen.

Tijdens zijn verblijf in het verpleeghuis vertoont Theo agressief gedrag. De hulp van een gespecialiseerde GGZ instelling wordt ingeschakeld. Daarbij krijgt Theo last van een hoge bloeddruk, waarvoor de specialist ouderengeneeskunde medicatie voorschrijft. Theo's zicht verminderd. Hij ondergaat hiervoor een staarbehandeling in het ziekenhuis, waarna hij weer terugkeert naar het verpleeghuis.

**NB. Vanuit deze reis is ook het ontslag en daarmee de plaatsing en overdracht van ziekenhuis naar wijkverpleging en van ziekenhuis naar verpleeghuis onderzocht gezien het hoge volume waarin deze transacties plaatsvinden.*

# Use Case	Brondossierhouder	Uitwisseling naar	Autorisatie doel
13	Ziekenhuis	Revalidatiecentrum	Ontslag
14	Revalidatiecentrum	Apotheek	Medicatie voorschrijven
15	Revalidatiecentrum	Ziekenhuis	Intercollegiale consultatie
16	Revalidatiecentrum	Verpleeghuis	Ontslag
17	Revalidatiecentrum	Huisarts	Intercollegiale update
18	Verpleeghuis	Ziekenhuis	Intercollegiale consultatie
19	Verpleeghuis	Wijkverpleging	Ontslag
20	Verpleeghuis	Huisarts	Intercollegiale update
21	Huisarts	Wijkverpleging	Verwijzing
22	Wijkverpleging	Verpleeghuis	Ontslag
23	Wijkverpleging	Huisarts	Intercollegiale update
24	Huisarts	Verpleeghuis	Verwijzing en ontslag
25	Verpleeghuis	GGZ	Verwijzing
26	Verpleeghuis	Apotheek	Medicatie uitschrijven
27	Verpleeghuis	Ziekenhuis	Verwijzing
28	Ziekenhuis	Verpleeghuis	Ontslag
*37	Ziekenhuis	Verpleeghuis	Ontslag, overdracht & plaatsing
*38	Ziekenhuis	Wijkverpleging	Ontslag, overdracht



Persona Kaylee

Kaylee is een jongvolwassene. Ze zit nog op school en heeft een bijbaantje. Haar ouders zijn gescheiden en ze woont bij haar vader.

Reis van Kaylee

Kaylee heeft last van een angststoornis en is daarvoor onder behandeling bij een GGZ instelling. Kaylee besluit bij haar moeder te gaan wonen en verhuist. Ze wordt verwezen naar een nieuwe GGZ instelling en een nieuwe huisarts.

Kaylee valt vaak flauw en gaat hiervoor naar het ziekenhuis. De behandelend arts informeert bij de GGZ instelling naar een mogelijke relatie tussen het flauwvallen en de angststoornis. Het ziekenhuis wil beelden laten maken en verwijst Kaylee hiervoor door naar een specialistisch ziekenhuis dat hiervoor beschikt over de juiste diagnostische middelen.

Het andere ziekenhuis stuurt de beelden inclusief diagnose naar het ziekenhuis waar Kaylee in behandeling is. Het blijkt een aangeboren hartafwijking te zijn. Kaylee krijgt medicatie voorgeschreven in het kader van haar hartafwijking. Kaylee blijft onder controle bij de hartfalenverpleegkundige. Deze verpleegkundige stuurt haar huisarts halfjaarlijks een update.

Kaylee gebruikt anticonceptie. Haar huisarts schrijft hiervoor een recept uit. Het medicament haalt ze op bij de apotheek in de stad waar haar vader woont.

# Use case	Brondossierhouder	Uitwisseling naar	Autorisatiedoel
29	GGZ	GGZ	Verwijzing
30	GGZ	Ziekenhuis	Intercollegiale consultatie
31	Ziekenhuis	Ziekenhuis	Verwijzing
32	Ziekenhuis	Ziekenhuis	Ontslag
33	Ziekenhuis	Apotheek	Medicatie voorschrijven
34	Ziekenhuis	Huisarts	Intercollegiale update
35	Huisarts	Apotheek	Voorschrijven medicatie
36	Apotheek	Huisarts	Intercollegiale update


Use cases

Toelichting

In de uitgewerkte use cases is een splitsing aangebracht tussen enerzijds een use case die de gegevensuitwisseling reflecteert en anderzijds een tabel die de karakteristieken van het autorisatieproces beschrijft. Iedere use case kent een brondossierhouder en een partij die gegevens ontvangt. Het is van belang om te vermelden dat alle use cases zijn opgesteld vanuit het perspectief van de brondossierhouder óf vanuit het perspectief van de ontvanger van gegevens.

Bouwstenen voor de use cases

In de use cases zijn de volgende bouwstenen gebruikt:



Sortering van use cases

De use cases zijn in dit document gegroepeerd per gegevensuitwisseling zoals beschreven in de patiëntreizen. In sommige gevallen is een use case opgeknipt in delen omdat verschillende actoren tegelijkertijd gegevens uitwisselen. In dit geval is de volgorde aangegeven met letters, bijv. 13a, 13b etc.


Karakteristieken van autorisatie

De karakteristieken van de verleende autorisatie zijn uitgewerkt in de tabel onder de visuele weergave van de gegevensuitwisseling. Hieronder worden de gehanteerde begrippen uit de tabel toegelicht:

Autorisatiedoel	Het doel dat bepaalt waarom Gegevensuitwisseling en dus autorisatie plaats moet vinden.
Perspectief	De partij op basis waarvan de use case is opgetekend (kan ontvanger of verzender zijn).
Type toestemming	Het type toestemming dat wordt verleend. Dit kan ook niet van toepassing zijn of onbekend voor de ontvanger
Wie verleent autorisatie	De actor die autorisatie tot gegevens verleent aan een andere actor
Wie wordt geautoriseerd	De actor die autorisatie tot gegevens ontvangt van de autorisatieverlener
Inhoud bepaald door	De actor die bepaalt welke gegevens gedeeld worden binnen de te verlenen autorisatie
Inhoud bepaald op basis van	Bepalende factoren voor de samenstelling van gegevens die gedeeld worden binnen de te verlenen autorisatie

Voorbeeld 1: Van Huisarts naar Huisartsenpost

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale consultatie, verwijzing	Brondossierhouder	Specifieke toestemmingsverklaring	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 1: Van Huisarts naar Huisartsenpost

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale consultatie, verwijzing	Brondossierhouder	Specifieke toestemmingsverklaring	Patiënt	Instelling	Applicatie	Template

Voorbeeld 1: Van Huisarts naar Huisartsenpost

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale consultatie, verwijzing	Brondossierhouder	Specifieke toestemmingsverklaring	Patiënt	Instelling	Applicatie	Template

Voorbeeld 1: Van Huisarts naar Huisartsenpost

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale consultatie, verwijzing	Brondossierhouder	Specifieke toestemmingsverklaring	Patiënt	Instelling	Applicatie	Template

Voorbeeld 1: Van Huisarts naar Huisartsenpost

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale consultatie, verwijzing	Brondossierhouder	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 2: Van Huisartsenpost naar Huisarts

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale update	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Applicatie	Template, professional judgement

Voorbeeld 3: Van Huisartsenpost naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Brondossierhouder	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 3: Van Huisartsenpost naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 3: Van Huisartsenpost naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Afdeling zorg	Behandelaar brondossierhouder	Applicatie

Voorbeeld 3: Van Huisartsenpost naar Ziekenhuis (spoed)

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 3: Van Huisarts(enpost) naar Ziekenhuis (planbaar)

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Afdeling zorg	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 3: Van Huisarts(enpost) naar Ziekenhuis (planbaar)

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Afdeling zorg	Applicatie	Template, professional judgement

Voorbeeld 4: Van Ziekenhuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Brondossierhouder	Specifieke toestemmingsverklaring	Patiënt	Behandelaar of instelling	Applicatie	Template, professional judgement

Voorbeeld 4: Van Ziekenhuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale consultatie, verwijzing	Brondossierhouder	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Mogelijke behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 4: Van Ziekenhuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 4: Van Ziekenhuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Template

Voorbeeld 4: Van Ziekenhuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Brondossierhouder	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 4: Van Ziekenhuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale consultatie, verwijzing	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Afdeling zorg	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 4: Van Ziekenhuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale consultatie	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Mogelijke behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 5: Van Ziekenhuis naar Apotheek

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Ontvanger	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 5: Van Ziekenhuis naar Apotheek

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Ontvanger	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 5: Van Ziekenhuis (klinisch) naar Apotheek

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Ontvanger	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template

Voorbeeld 5: Van Ziekenhuis (poliklinisch) naar Apotheek

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Ontvanger	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template

Voorbeeld 6: Van Ziekenhuis naar Huisarts

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Template, Professional judgement

Voorbeeld 6: Van Ziekenhuis naar Huisarts

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag	Brondossierhouder	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 6: Van Ziekenhuis naar Huisarts

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag	Brondossierhouder	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 6: Van Ziekenhuis naar Huisarts

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag	Brondossierhouder	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Applicatie	Template, professional judgement

Voorbeeld 7: Van Ziekenhuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag	Ontvanger	Specifieke toestemmingsverklaring	Patiënt	Behandelaar of instelling	Applicatie	Template, professional judgement

Voorbeeld 7: Van Ziekenhuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, Overdracht	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 7: Van Ziekenhuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Brondossierhouder	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Afdeling zorg	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 7: Van Ziekenhuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Ontvanger	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 8: Van Ziekenhuis naar Revalidatiecentrum

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, Overdracht	Brondossierhouder	Onbekend	behandelaar brondossierhouder	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Applicatie

Voorbeeld 8: Van Ziekenhuis naar Revalidatiecentrum

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Brondossierhouder	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Ondersteunende afdeling	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 8: Van Ziekenhuis naar Revalidatiecentrum

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, plaatsing	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Ondersteunende afdeling	Ondersteunende afdeling	Ondersteunende afdeling	Template

Voorbeeld 8: van Ziekenhuis naar Revalidatiecentrum poliklinisch

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Afdeling zorg	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 9: Van Huisarts / POH naar GGZ Poliklinisch

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 9: Van Huisarts / POH naar GGZ Poliklinisch

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Instelling	Behandelaar brondossierhouder en ontvangende instelling	Template

Voorbeeld 9: Van Huisarts / POH naar GGZ Poliklinisch

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Brondossierhouder	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Afdeling zorg	Behandelaar brondossierhouder, en ontvangende instelling	Template

Voorbeeld 9: Van Huisarts / POH naar GGZ Poliklinisch

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Brondossierhouder	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Afdeling zorg	Behandelaar brondossierhouder , en ontvangende instelling	Template

Voorbeeld 9: Van Huisarts / POH naar GGZ Poliklinisch

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Applicatie, professional judgement

Voorbeeld 10: Van GGZ Poliklinisch naar Apotheek

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Brondossierhouder	Specifieke toestemmingsverklaring	Behandelaar brondossierhouder	Instelling	Applicatie	Template, professional judgement

Voorbeeld 10: Van GGZ Poliklinisch naar Apotheek

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Ontvanger	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template

Voorbeeld 10: Van GGZ Poliklinisch naar Apotheek

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Ontvanger	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 10: Van GGZ Poliklinisch naar Apotheek

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Ontvanger	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 10: Van GGZ poliklinisch naar Apotheek

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Brondossierhouder	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 10: Van GGZ poliklinisch naar Apotheek

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Brondossierhouder	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 11: Van GGZ poliklinisch naar Huisarts / POH

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 11: Van GGZ poliklinisch naar Huisarts / POH

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag	Brondossierhouder	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 11: Van GGZ poliklinisch naar Huisarts / POH

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag	Brondossierhouder	Specifieke toestemmingsverklaring	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 12: Van Apotheek naar Apotheek

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale update	Beide	Specifieke toestemmingsverklaring	Patiënt	Behandelaar	Applicatie	Template

Voorbeeld 12: Van Apotheek naar Apotheek

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale update	Beide	Specifieke toestemmingsverklaring	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 12: Van Apotheek naar Apotheek

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale update	Beide	Specifieke toestemmingsverklaring	Patiënt	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 12: Van Apotheek naar Apotheek

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale update	Beide	Specifieke toestemmingsverklaring	Patiënt	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 13: Van Ziekenhuis naar Revalidatiecentrum Poliklinisch

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Brondossierhouder	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 13: Van Ziekenhuis naar Revalidatiecentrum

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Afdeling zorg	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 13: Van Ziekenhuis naar Revalidatiecentrum

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, plaatsing	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Ondersteunende afdeling	Ondersteunende afdeling	Ondersteunende afdeling	Applicatie, template

Voorbeeld 13: Van Ziekenhuis naar Revalidatiecentrum (klinisch)

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag	Brondossierhouder	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 13: Van Ziekenhuis naar Revalidatiecentrum (klinisch)

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, Overdracht	Brondossierhouder	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 13a: Van Ziekenhuis naar Revalidatiecentrum Klinisch (plaatsing)

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, plaatsing	Brondossierhouder	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Ondersteunende afdeling	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 13b: Van Ziekenhuis naar Revalidatiecentrum Klinisch (verwijzing)

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Brondossierhouder	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 13c: Van Ziekenhuis naar Revalidatiecentrum Klinisch (Ontslag, overdracht)

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Brondossierhouder	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 13c: Van Ziekenhuis naar Revalidatiecentrum Klinisch (Ontslag, overdracht)

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Brondossierhouder	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 14: Van Revalidatiecentrum Klinisch naar Apotheek

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Brondossierhouder	Algemene toestemmingsverklaring	Behandelaar brondossierhouder	Instelling	Applicatie	Template, professional judgement

Voorbeeld 14: Van Revalidatiecentrum Poliklinisch naar Apotheek

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Brondossierhouder	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 14: Van Revalidatiecentrum naar Apotheek

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Ontvanger	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template

Voorbeeld 14: Van Revalidatiecentrum naar Apotheek

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Ontvanger	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 14: Van Revalidatiecentrum naar Apotheek

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Ontvanger	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 15: Van Revalidatiecentrum (klinisch) naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale consultatie	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 15: Van Revalidatiecentrum naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale consultatie	Brondossierhouder	Niet van toepassing	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 15: Van Revalidatiecentrum naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale consultatie	Brondossierhouder	Algemene toestemmingsverklaring	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 15: Van Revalidatiecentrum naar Algemeen ziekenhuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale consultatie	Ontvanger	Niet van toepassing	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 16: Van Revalidatiecentrum naar Verpleeghuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Ontvanger	Fysieke toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 16: Van Revalidatiecentrum naar Wijkverpleging (plaatsing)

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, plaatsing	Brondossierhouder	Algemene toestemmingsverklaring	Ondersteunende afdeling	Instelling	Applicatie	Template

Voorbeeld 16: Van Revalidatiecentrum naar Verpleeghuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Ontvanger	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 16: Van Revalidatiecentrum naar Wijkverpleging (overdracht)

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Brondossierhouder	Algemene toestemmingsverklaring	Ondersteunende afdeling	Instelling	Applicatie	Template

Voorbeeld 17: Van Revalidatiecentrum Poliklinisch naar Huisarts

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale update	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 17: Van Revalidatiecentrum Klinisch naar Huisarts

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag	Brondossierhouder	Algemene toestemmingsverklaring	Patiënt	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder of patiënt	Template, professional judgement

Voorbeeld 18: Van Verpleeghuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale consultatie	Brondossierhouder	Algemene toestemmingsverklaring	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 18: Van Verpleeghuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale consultatie	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 18: Van Verpleeghuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale consultatie	Brondossierhouder	Niet van toepassing	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 19: Van Verpleeghuis naar Wijkverpleging

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Brondossierhouder	Patiënt geeft zelf informatie	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 19: Van Verpleeghuis naar Wijkverpleging

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, Plaatsing	Ontvanger	Onbekend	Ondersteunende afdeling	Ondersteunende afdeling	Ondersteunende afdeling	Template

Voorbeeld 19: Van Verpleeghuis naar Wijkverpleging

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Ontvanger	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement, regionale samenwerking

Voorbeeld 19: Van Verpleeghuis naar Wijkverpleging

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 19: Van Verpleeghuis naar Wijkverpleging

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 19: Van Verpleeghuis naar Wijkverpleging

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, plaatsing	Brondossierhouder	Onbekend	Ondersteunende afdeling	Instelling	Ondersteunende afdeling	Template

Voorbeeld 20: Van Verpleeghuis naar Huisarts

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag	Brondossierhouder	Algemene toestemmingsverklaring	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 20: Van Verpleeghuis naar Huisarts

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale update	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 21: Van Huisarts naar Wijkverpleging

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Applicatie	Template

Voorbeeld 22: Van Wijkverpleging naar Verpleeghuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, plaatsing	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Ondersteunende afdeling	Ondersteunende afdeling	Behandelaar brondossierhouder	Template

Voorbeeld 22: Van Wijkverpleging naar Verpleeghuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Ontvanger	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 22: Van Wijkverpleging naar Verpleeghuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, plaatsing	Brondossierhouder	Algemene toestemmingsverklaring	Ondersteunende afdeling	Ondersteunende afdeling	Ondersteunende afdeling	Template, professional judgement

Voorbeeld 22: Van Wijkverpleging naar Verpleeghuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Brondossierhouder	Algemene toestemmingsverklaring	Behandelaar brondossierhouder	Afdeling zorg	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement, regionale samenwerking,

Voorbeeld 22: Van Wijkverpleging naar Verpleeghuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, plaatsing	Brondossierhouder	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Ondersteunende afdeling	Behandelaar brondossierhouder	Regionale afhankelijkheid

Voorbeeld 22: Van Wijkverpleging naar Verpleeghuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Brondossierhouder	Niet van toepassing	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Regionale afhankelijkheid

Voorbeeld 22: Van Wijkverpleging naar Verpleeghuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Brondossierhouder	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Regionale afhankelijkheid

Voorbeeld 23: Van Wijkverpleging naar Huisarts

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale update	Brondossierhouder	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 23: Van Wijkverpleging naar Huisarts

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale update	Brondossierhouder	Niet van toepassing	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 23: Van Wijkverpleging naar Huisarts

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale update	Ontvanger	Gezamenlijke besluitvorming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 24: Van Huisarts naar Verpleeghuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 24: Van Huisarts naar Verpleeghuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 24: Van Huisarts naar Verpleeghuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Ontvanger	Specifieke toestemmingsverklaring	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Ondersteunende afdeling	Template

Voorbeeld 24a: Van Huisarts naar Verpleeghuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, plaatsing	Brondossierhouder	Veronderstelde toestemming	Ondersteunende afdeling	Instelling	Ondersteunende afdeling	Template, professional judgement

Voorbeeld 24b: Van Huisarts naar Verpleeghuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Brondossierhouder	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Applicatie	Template

Voorbeeld 24c: Van Huisarts naar Verpleeghuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Brondossierhouder	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 25: Van Verpleeghuis naar GGZ Poliklinisch

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Instelling	Behandelaar brondossierhouder en ontvangende instelling	Template

Voorbeeld 25: Van Verpleeghuis naar GGZ poliklinisch

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale consultatie	Brondossierhouder	Algemene toestemmingsverklaring	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 25: Van Verpleeghuis naar GGZ poliklinisch

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale consultatie	Brondossierhouder	Specifieke toestemmingsverklaring	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar

Voorbeeld 25: Van Verpleeghuis naar GGZ poliklinisch

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 25: Van Verpleeghuis naar GGZ poliklinisch

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Applicatie, professional judgement

Voorbeeld 25: Van Verpleeghuis naar GGZ poliklinisch (spoed)

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Gezamenlijke besluitvorming	Behandelaar brondossierhouder en patiënt	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 26: Van Verpleeghuis naar Apotheek

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Brondossierhouder	Algemene toestemmingsverklaring	Behandelaar brondossierhouder	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 26: Van Verpleeghuis naar Apotheek

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Ontvanger	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template

Voorbeeld 26: Van Verpleeghuis naar Apotheek

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Ontvanger	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 26: Van Verpleeghuis naar Apotheek

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Brondossierhouder	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 27: Van Verpleeghuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	afdeling zorg of behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 27: Van Verpleeghuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Patiënt geeft zelf informatie	Behandelaar brondossierhouder	Afdeling zorg	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 27: Van Verpleeghuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Brondossierhouder	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Afdeling zorg	Behandelaar brondossierhouder	Applicatie, professional judgement

Voorbeeld 27: Van Verpleeghuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Brondossierhouder	Patiënt geeft zelf informatie	Behandelaar brondossierhouder	Afdeling zorg	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 28: Van Ziekenhuis naar Verpleeghuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag	Ontvanger	Behandelrelatie	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 28: Van Ziekenhuis naar Verpleeghuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Ontvanger	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Template

Voorbeeld 28: Van Ziekenhuis naar Verpleeghuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Brondossierhouder	Niet van toepassing	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Applicatie	Template

Voorbeeld 28: Van Ziekenhuis naar Verpleeghuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag	Brondossierhouder	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Template

Voorbeeld 28: Van Ziekenhuis naar Verpleeghuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag	Brondossierhouder	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Applicatie	Template, professional judgement

Voorbeeld 28: Van Ziekenhuis naar Verpleeghuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Ontvanger	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 29: Van GGZ Poliklinisch naar GGZ Poliklinisch

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Specifieke toestemmingsverklaring	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 29: Van GGZ poliklinisch naar GGZ poliklinisch

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 29: Van GGZ poliklinisch naar GGZ poliklinisch

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 30: Van GGZ Poliklinisch naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale consultatie	Ontvanger	Specifieke toestemmingsverklaring	Patiënt	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 30: Van GGZ poliklinisch naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale consultatie	Brondossierhouder	Niet van toepassing	Behandelaar brondossierhouder of ondersteunende afdeling	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder of ondersteunende afdeling	Professional judgement

Voorbeeld 30: Van GGZ Poliklinisch naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale consultatie	Brondossierhouder	Specifieke toestemmingsverklaring	Patiënt	Afdeling zorg	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 31: Van Ziekenhuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Afdeling zorg	Behandelaar brondossierhouder	Template

Voorbeeld 31: Van Ziekenhuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Mogelijke behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 32: Van Ziekenhuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Brondossierhouder	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Mogelijke behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 32: Van Ziekenhuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Brondossierhouder	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Mogelijke behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 32: Van Ziekenhuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Ontvanger	Specifieke toestemmingsverklaring	Patiënt	Mogelijke Behandelaar	Applicatie	Template

Voorbeeld 32: Van Ziekenhuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Ontvanger	Niet van toepassing	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Professional judgement

Voorbeeld 32: Van Ziekenhuis naar Ziekenhuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Verwijzing	Brondossierhouder	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Afdeling zorg	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 33: Van Ziekenhuis naar Apotheek

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Brondossierhouder	Specifieke toestemmingsverklaring	Patiënt	Afdeling zorg	Applicatie	Template

Voorbeeld 33: Van Ziekenhuis naar Apotheek

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Brondossierhouder	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 33: Van Ziekenhuis naar Apotheek

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Ontvanger	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 33: Van Ziekenhuis naar Apotheek

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Ontvanger	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 33: Van Ziekenhuis naar Apotheek

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Ontvanger	Patiënt geeft zelf informatie	Behandelaar brondossierhouder	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template

Voorbeeld 33: Van Ziekenhuis naar Apotheek

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Ontvanger	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template

Voorbeeld 33: Van Ziekenhuis naar Apotheek (poliklinisch)

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Brondossierhouder	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 34: Van Ziekenhuis naar Huisarts

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale update	Brondossierhouder	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar of instelling	Applicatie	Template, professional judgement

Voorbeeld 34: Van Ziekenhuis naar Huisarts

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale update	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Applicatie	Template, professional judgement

Voorbeeld 35: Van Huisarts naar Apotheek

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Ontvanger	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template

Voorbeeld 35: Van Huisarts / POH naar Apotheek

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Ontvanger	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Instelling	Applicatie	Template, professional judgement

Voorbeeld 35: Van Huisarts naar Apotheek

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Ontvanger	Patiënt geeft zelf informatie	Patiënt	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 35: Van Huisarts naar Apotheek

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Ontvanger	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Instelling	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 35: Van Huisarts naar Apotheek

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Medicatie voorschrijven	Brondossierhouder	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Instelling	Applicatie	Template, professional judgement

Voorbeeld 36: Van Apotheek naar Huisarts

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale update	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Template, professional judgement

Voorbeeld 36: Van Apotheek naar Huisarts

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale update	Brondossierhouder	Niet van toepassing	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Applicatie	Template, professional judgement

Voorbeeld 36: Van Apotheek naar Huisarts

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Intercollegiale update	Brondossierhouder	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Behandelaar brondossierhouder	Template

Voorbeeld 37: Van Ziekenhuis naar Verpleeghuis

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht & plaatsing	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Applicatie	Template

Voorbeeld 37: Van Ziekenhuis naar Verpleeghuis (klinisch)

Gegevensuitwisseling




Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht & plaatsing	Brondossierhouder	Onbekend	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Applicatie	Template

Voorbeeld 38: Van Ziekenhuis naar Wijkverpleging

Gegevensuitwisseling



Karakteristieken van autorisatie

Autorisatiedoel	Perspectief	Type toestemming	Wie verleent autorisatie	Wie wordt geautoriseerd	Inhoud bepaald door	Inhoud op basis van
Ontslag, overdracht	Ontvanger	Veronderstelde toestemming	Behandelaar brondossierhouder	Behandelaar	Applicatie	Template